

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
	ระดับประเทศ	9,455,777	387,687	279,372	72.06	279,463	72.08
AHB 1							
1	เชียงราย	182,699	4,019	5,116	127.28	5,292	131.66
2	น่าน	76,067	1,673	2,357	140.84	2,399	143.35
3	พะเยา	81,219	1,787	1,779	99.56	1,813	101.47
4	แพร่	85,220	1,875	1,842	98.25	1,875	100.01
5	เชียงใหม่	270,405	5,949	5,681	95.50	4,792	80.55
6	แม่ฮ่องสอน	28,507	627	445	70.96	465	74.14
7	ลำปาง	142,277	3,130	4,056	129.58	4,127	131.85
8	ลำพูน	76,684	1,687	1,297	76.88	1,484	87.96
	รวม	943,078	20,748	22,573	108.80	22,247	107.23
AHB 2							
9	ตาก	64,337	1,415	1,139	80.47	1,176	83.09
10	พิษณุโลก	135,506	2,981	3,871	129.85	3,864	129.62
11	เพชรบูรณ์	152,415	3,353	4,214	125.67	4,451	132.74
12	สุโขทัย	102,616	2,258	3,464	153.44	3,485	154.37
13	อุตรดิตถ์	82,491	1,815	2,913	160.51	2,912	160.46
	รวม	537,365	11,822	15,601	131.97	15,888	134.39
AHB 3							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
14	ชัยนาท	64,626	2,908	3,118	107.22	3,708	127.50
15	กำแพงเพชร	108,347	2,384	2,825	118.52	3,257	136.64
16	พิจิตร	95,957	2,111	3,514	166.46	3,479	164.80
17	นครสวรรค์	182,602	4,017	7,047	175.42	6,189	154.06
18	อุทัยธานี	57,075	1,256	2,844	226.50	2,891	230.24
	รวม	508,607	12,676	19,348	152.64	19,524	154.03
AHB 4							
19	นนทบุรี	185,630	8,353	4,690	56.15	4,079	48.83
20	ปทุมธานี	129,937	5,847	5,776	98.78	6,000	102.61
21	พระนครศรีอยุธยา	129,585	5,831	5,253	90.08	5,482	94.01
22	สระบุรี	90,647	4,079	1,476	36.18	1,588	38.93
23	ลพบุรี	121,213	5,455	3,225	59.12	3,363	61.65
24	สิงห์บุรี	42,744	1,923	1,688	87.76	1,775	92.28
25	อ่างทอง	53,695	2,416	3,034	125.57	2,933	121.39
26	นครนายก	43,975	1,979	1,825	92.22	1,769	89.39
	รวม	797,426	35,884	26,967	75.15	26,989	75.21
AHB 5							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุด tasse ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
27	กาญจนบุรี	109,759	4,939	3,608	73.05	3,598	72.85
28	นครปฐม	130,487	5,872	3,641	62.01	4,044	68.87
29	ราชบุรี	138,710	6,242	1,903	30.49	2,004	32.11
30	สุพรรณบุรี	148,907	6,701	3,264	48.71	3,386	50.53
31	ประจวบคีรีขันธ์	74,051	3,332	2,137	64.13	2,136	64.10
32	เพชรบุรี	77,437	3,485	1,999	57.37	2,045	58.69
33	สมุทรสงคราม	38,196	1,719	695	40.43	752	43.75
34	สมุทรสาคร	70,398	3,168	1,640	51.77	1,739	54.89
	รวม	787,945	35,458	18,887	53.27	19,704	55.57
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	105,382	4,742	3,003	63.33	3,080	64.95
36	ปราจีนบุรี	69,981	3,149	1,881	59.73	1,916	60.84
37	สระแก้ว	69,094	3,109	2,883	92.72	2,791	89.76
38	สมุทรปราการ	164,744	7,413	2,259	30.47	2,676	36.10
39	จันทบุรี	81,443	3,665	1,597	43.58	1,557	42.48
40	ชลบุรี	168,605	7,587	3,143	41.42	3,226	42.52
41	ตราด	33,653	1,514	624	41.20	690	45.56
42	ระยอง	78,870	3,549	1,890	53.25	1,999	56.32
	รวม	771,772	34,730	17,280	49.76	17,935	51.64
AHB 7							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
43	กาฬสินธุ์	134,216	5,637	3,362	59.64	3,460	61.38
44	ขอนแก่น	266,090	11,176	9,225	82.54	8,463	75.73
45	มหาสารคาม	140,111	5,885	8,604	146.21	8,714	148.08
46	ร้อยเอ็ด	191,089	8,026	7,450	92.83	7,544	94.00
	รวม	731,506	30,723	28,641	93.22	28,181	91.73
AHB 8							
47	บึงกาฬ	48,376	2,032	3,153	155.18	2,316	113.99
48	เลย	93,591	3,931	3,471	88.30	3,318	84.41
49	หนองคาย	67,128	2,819	2,490	88.32	3,396	120.45
50	หนองบัวลำภู	63,264	2,657	2,898	109.07	2,825	106.32
51	อุดรธานี	194,312	8,161	7,377	90.39	7,346	90.01
52	นครพนม	89,682	3,767	3,546	94.14	3,394	90.11
53	สกลนคร	135,165	5,677	5,198	91.56	5,284	93.08
	รวม	691,518	29,044	28,133	96.86	27,879	95.99
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	175,463	7,369	6,458	87.63	6,871	93.24
55	นครราชสีมา	388,663	16,324	11,907	72.94	11,364	69.62
56	บุรีรัมย์	217,388	9,130	8,055	88.22	8,199	89.80
57	สุรินทร์	195,250	8,201	7,782	94.90	7,917	96.54
	รวม	976,764	41,024	34,202	83.37	34,351	83.73
AHB 10							

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
58	มุกดาหาร	42,567	1,788	2,154	120.48	2,191	122.55
59	ยโสธร	77,783	3,267	3,427	104.90	3,530	108.05
60	ศรีสะเกษ	198,927	8,355	5,891	70.51	6,336	75.84
61	อุบลราชธานี	235,150	9,876	7,053	71.41	6,251	63.29
62	อำนาจเจริญ	50,322	2,114	1,197	56.64	1,438	68.04
	รวม	604,749	25,399	19,722	77.65	19,746	77.74
AHB 11							
63	ชุมพร	75,579	2,872	2,007	69.88	2,188	76.18
64	นครศรีธรรมราช	234,789	8,922	5,947	66.66	6,398	71.71
65	สุราษฎร์ธานี	134,967	5,129	8,361	163.02	8,084	157.62
66	กระบี่	47,460	1,803	1,376	76.30	1,465	81.23
67	พังงา	37,824	1,437	1,370	95.32	1,411	98.17
68	ภูเก็ต	36,940	1,404	554	39.47	561	39.97
69	ระนอง	22,543	857	665	77.63	646	75.41
	รวม	590,102	22,424	20,280	90.44	20,753	92.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 12							
70	พัทลุง	84,551	3,213	3,760	117.03	3,914	121.82
71	ตรัง	86,029	3,269	4,232	129.45	4,217	129.00
72	นราธิวาส	82,423	3,132	2,799	89.37	2,834	90.48
73	ปัตตานี	80,223	3,048	1,858	60.95	1,906	62.52
74	ยะลา	57,887	2,200	1,219	55.42	1,233	56.05
75	สงขลา	189,897	7,216	5,181	71.80	4,499	62.35
76	สตูล	35,176	1,337	636	47.58	716	53.57
	รวม	616,186	23,415	19,685	84.07	19,319	82.51
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	898,759	64,711	8,053	12.44	6,947	10.74
	รวม	898,759	64,711	8,053	12.44	6,947	10.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กย 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น